

A DEVIÁNS VISELKEDÉS FŐ FORMÁI

Bevezetés a szociológiába
WJLF

Pecze Mariann


DROGFOGYASZTÁS

Pszichoaktív drog: a mentális működésre ható szerek
(gondolkodás, érzékelés, hangulat)

WHO, BNO-10 (Betegségek Nemzetközi Osztályozása),
DSM-IV. (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders)

- Abúzus < dependencia < addikció, viselkedéskontroll ↓
- Fázisok (öröm < szenvedély < állapotromlás < terminális)
- Csoportosítás (legális vs. illegális; könnyű vs. nehéz:
jogi/kult.)

Thomas Szasz: „Ha a drogok kémiája alapján
elemezzük a drogfogyasztást, az olyan, mintha a
szentelt vizet a víz kémiai összetétele alapján
értelmeznénk”



DROGFOGYASZTÁS II.

Többféle értelmezési keret: orvosi, filozófiai, jogi, szociológiai

Drogpolitikai modellek

1. Keresletcsökkentő
2. Kínálatcsökkentő
3. Ártalomcsökkentő

Más felosztásban:

1. Nulltolerancia modell (USA)
2. Kompromisszumos modell (Anglia)
3. Normalizáló modell (Hollandia)

DROGFOGYASZTÁS III.

(1) Drog-epidemiológia

- 1960-70: USA, első hazai adatok: 1974 (elszigeteltség oldódni kezd), drogambulanciák: 1987 (társi problémák) növekvő tranzitcsempészet (heroin-Balkán-útvonal; kokain-Dél-Amerika)
- Rendszerváltozás után: hozzáférhető anyagok, módszerek bővülése – célország
- Folyamatos emelkedés (függő: 50-60.000; 150.000 alkalmi fogyasztó) Demetrovics Zsolt, Elekes Zs.-Paksi B.
- Mérés: eg.ügyi források (sürgősségi, halálozás, gyógyszerfelírás), rendőrség, határőrség, VPOP, börtönstat., kezelőintézmények adatai

nyában Bánfalvi

tlanságcsökkentő,
konási tüneteket is
z 1963-ban piacra
közkedve vált.

kiderült, hogy tá-
dése kiválthat szé-
t, sőt okozhat dep-
zést is. Az amné-
ő hatásmechaniz-
con úgynevezett
- kisebb, alvatást
zásoknál, például
gyógyászatban ma is
két évtizedes kar-
ejéig tartott, s fel-
adarabjaiban, illet-
édiáiban, például

zponti idegrend-
tevé vegyület tört
iac egyeduralmá-
nax, később nira-
ak. Orvostörténe-
hivatalos
stromon a
y időben
ta, amely-
épp a xa-
kon való-
: azonban
atásai. „A
yógyítja –
a pánikot
a gyártó
vizsgálat
cég meg-
wáb-
zerről

Veronál
1907

Ady Endre,
Jászai Oszkár
Juhász Gyula

Luminál
1912

József Jolán,
Seress Rezső-
Jávor László:
Szomorú vasár-
nap

Benzedrin
1936

Jack Kerouac:
Úton,
Allen Ginsberg,
Judy Garland,
William
Burroughs,
Bob Fosse:
Mindhalálig
zene,
Ian Fleming:
Bond-regények,
Beatles,
Erdős Pál

Válíum
1963

Woody Allen:
Annie Hall,
Neil Simon-
színdarabok,
Rolling Stones:
Mother's Little
Helper

Xanax
1981

Brett Easton
Ellis: Amerikai
pszicho

Prozac
1987

Elizabeth Wurtzel:
Prozac-ország

lkonná vált szorongáscsökkentő gyógy- szerek, ismertebb használói és a szereket népszerűsítő alkotások


szer, a lítium, a
prozac, a de-
sipramine meg
az alvatóként
bevett desyrel
együttvéve sem
tudna megbir-
kózni azzal, ami a ba-
jom” – számol be dep-
resszióélményéről Eli-
zabeth Wurtzel ameri-
kai diáklány Prozac-
ország című, 1994-ben
megjelent regényé-
ben. A gyógyszergyár-
tók az 1980-as évek vé-
gén álltak elő a cím-
ben szereplő, a méla-
kórt mellékhatások
nélkül felszámolni hi-

vatott, új generációsnak is nevezett medi-
cinával. S a szer másoknál működni lát-
szott: a szóban forgó, önéletrajzi ihletett-
ségű bestseller megjelenése idején pél-
dával az USA-ban havi 1 millió alkalom-
mal írtak fel az orvosok prozacot a pá-
cienseiknek. A bevezetéskor
nem reklámozott mellékha-
tások viszont csupán az utób-
bi években kerültek nyilván-
osságra: az öngyilkossági
késztetés, a libidócsökkenés,

a vérzékenység és a felnőttkori cukor-
betegség kialakulásának kockázata
mellett például az, hogy a középisko-
lai egyetemi lövöldözés gyilkosságok



A regisztrált kábítószerfogyasztók megoszlása a főbb szerek szerint, 2001. (KSH)




Az eg.ügyi intézményekben kezelésre jelentkezett kábítószer-fogyasztók

Év *Nyilvántartott
drogbetegek száma*

1995	3 553
1996	4 718
1997	8 494
1998	9 458
1999	12 765
2000	12 789
2001	12 049

Forrás: OPNI, KSH




Forrás: Országos Addiktológiai Intézet (2004-ig Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet).

A lefoglalt kábítószer mennyiségének eloszlása drogfajták szerint 2000-2004 időszakban (ERÜBS)


Drogfajták	2000-ben	2001-ben	2002-ben	2003-ban	2004-ben
Heroin (kg)	670	154,41	159,65	256,3	83,5
Kokain (kg)	10,9	6,02	54,9	22,39	107,9
Hasis (kg)	19	0,88	3,35	1,53	128,6
Marihuána (kg)	112	131,03	103,44	206,8	15,8 + 2500 tő
Morfin /poppy/ (kg)	n. a.	n. a.	n. a.	2,86	n. a.
Ópium (kg)	n. a.	n. a.	n. a.	0,002	n. a.
Amfetamin (kg)	10,5	1,48	3,51	12,1	9
LSD (db)	1.519	972,5	632	345,5	81
Extasy tableta (db)	15.154	18.662,5	24.854	135.634	169.252

Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetői száma (2000-2004) a teljes és fiatalkorú populációban

A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt indított büntetőeljárások elkövetőinek száma 2000-2004 között



A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény eljárás alá vont fiatalkorú elkövetőinek száma 2000-2004 között



ESPAD-vizsgálat (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs)

- Középiskolások körében, 4 évente végzett felmérés

1995

nyugtató+alkoholszerves oldószeres

Többség: kipróbáló

Életprev. 4-5 %

Kipróbálás: 16 év felett

1999

marihuána előlép, szintetikus party-drogok


2003

nyugtató, altató(17%), marihuána, disco drogok
(EXT, amfet)

Életprev. 16 %


kipróbálás: 14-15 év

A tiltott szerek életprevalencia értéke nemenként a 16 évesek körében (%)



Forrás: ESPAD Riport
(1995,1999,2003)


A tiltott szerek életprevalencia értéke településtípusonként (2003) (%)





BŰNÖZÉS





Azon viselkedésformák, amelyek biz. szükségletek kielégítése vagy konfliktusok feloldása érdekében megvalósulnak, sértik az általánosan elfogadott, védett értékeket, normákat.

Társadalmi okok:

- A társadalomhoz való alkalmazkodás problémája
- Esélyek, társ.i egyenlőtlenségek következménye

BŰNÖZÉS II.

- Típusok:
 - Multinacionális (terrorizmus, fegyverkeresk.)
 - Fehérgalléros (sikkasztás)
 - Politikai (választási csalás)
 - Szervezett (prostitúció, szerencsejáték)
 - Hivatali (korrupció, zsarolás)
 - Profi (rablás, szélhámosság)
 - Hagyományos (ittasság, csavargás, emberölés, nemi erőszak)
- Statisztikai nehézségek
 - Látens bűnözés
 - Változó társ.i megítélés
 - Halmazódások
- Adatok: ismertté vált bűncselekmények, elkövetők, eljárás alá vontak, elítéltek, fogvatartottak, viktimológia, ERÜBS (Egységes Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika)

A bűnözés terjedelme és dinamikája (1973-1992)

Év	Bűnse- lekmények száma	Ha 1973=100%	10 000 la- kosra jutó bűnselek- mények száma	A bűnse- lekmény elkövetője ismeretlen marad	A bűnse- lekményt elkövetők száma	10 000 la- kosra jutó bűnselek- ményt elkö- vetők száma
1973	119 290	100,0	114,6	21 525	83 531	80,2
1974	111 825	93,7	107,3	21 425	76 308	73,0
1975	120 889	101,3	115,0	25 488	81 045	77,1
1976	129 424	108,5	122,4	25 498	83 655	79,1
1977	123 623	103,6	116,3	25 315	82 608	77,7
1978	126 907	106,4	118,9	27 745	83 645	78,4
1979	125 267	105,0	117,1	29 942	78 217	73,1
1980	130 470	109,4	121,9	34 022	77 154	72,1
1981	134 914	113,1	125,9	35 804	82 354	76,9
1982	139 795	117,2	130,5	39 400	82 104	76,7
1983	151 505	127,0	141,6	43 883	88 591	82,8
1984	157 036	131,6	147,1	47 692	89 043	83,4
1985	165 816	139,0	155,6	52 700	91 216	85,6
1986	182 867	153,3	171,9	57 583	99 114	93,2
1987	188 397	157,9	177,4	61 332	97 645	91,9
1988	185 344	155,4	174,8	68 203	87 844	82,8
1989	225 393	188,9	212,9	101 080	94 704	89,4
1990	341 061	285,9	328,7	179 953	118 046	113,8
1991	440 370	369,2	425,3	260 909	129 641	125,2
1992	447 215	374,9	432,6	218 046	140 405	135,8

A bűncselekmények száma és 10.000 lakosra jutó gyakorisága megyénként

Megyék, főváros	Bűncselekmények száma és gyakoriságának rangsora				10 000 lakosra jutó bűncselekmények 1992-ben
	1988-ban szám rangsor		1992-ben szám rangsor		
Baranya	7 066	8	15 252	9	365,1
Bács-Kiskun	9 602	5	21 199	7	390,8
Békés	5 486	14	13 389	13	329,1
Borsod-A-Z.	12 565	10	26 488	10	351,8
Csongrád	5 930	17	16 378	8	373,6
Fejér	9 494	2	17 022	5	402,9
Győr-M-Sopron	6 972	7	13 984	14	327,6
Hajdú-Bihar	10 039	3	30 029	2	546,4
Heves	4 452	15	9 952	18	299,9
Komárom-Eszterg.	5 209	9	12 349	6	393,7
Nógrád	2 786	19	6 764	17	301,5
Pest	16 637	6	44 589	4	467,5
Somogy	6 256	4	16 031	3	468,6
Szabolcs-Sz-Bereg	8 959	12	19 805	11	349,8
Jász-N-Szolnok	5 352	18	13 844	15	327,4
Tolna	3 453	16	8 151	16	323,5
Vas	3 208	20	7 399	19	269,3
Veszprém	6 205	11	13 189	12	348,5
Zala	4 361	13	8 029	20	264,2
Megyék összesen	134 032		313 843		377,2
Főváros	50 965	1	132 855	1	659,0
Országos összesen	185 344		447 215		432,6

Ismertté vált bűncselekmények (2000.)

Személy elleni		16.591 fő
	ebből: Befejezett emberölés	203 fő
	Szándékos testi sértés	10.901 fő
közlekedési		19.566 fő
Házasság, család, ifjúság		5.059 fő
Államigazgatás, ig.szolg.		10.408 fő
	ebből: embercsempészás	5.178 fő
Közrend elleni		76.312 fő
	ebből: garázdaság	7.817 fő
	Visszaélés kábítószerrel	3.445 fő
gazdasági		10.986 fő
Vagyon elleni		311.611 fő
	ebből: lopás	230.830 fő


Ismertté vált közvádas bűncselekmények és elkövetőik statisztikája, 1990 - 2003

Év	Össze- sen	Ebből					Felderített bűncselek- mények aránya	Ismertté vált bűnelkövető	
		személy elleni	közle- kedési	közrend elleni	gazda- sági	vagyon elleni		összesen	100 ezer lakosra
1990	341 061	13 043	25 976	14 727	9 858	265 937	49%	112 254	1 327
1991	440 370	13 974	29 942	18 474	8 347	356 671	43%	122 835	1 444
1992	447 222	14 824	33 130	27 480	8 913	350 586	53%	132 644	1 553
1993	400 935	14 782	29 362	31 230	6 146	307 396	59%	122 621	1 432
1994	389 451	16 150	26 556	43 379	4 085	287 095	57%	119 494	1 392
1995	502 036	16 096	24 633	55 061	5 064	391 062	63%	121 121	1 409
1996	466 050	14 720	20 689	48 598	5 409	365 235	50%	122 226	1 420
1997	514 403	16 445	21 203	65 946	6 543	393 003	53%	130 966	1 521
1998	600 621	18 684	22 423	75 592	13 454	457 188	57%	140 083	1 626
1999	505 716	18 882	20 503	71 063	20 318	358 036	55%	131 658	1 527
2000	450 673	16 591	19 566	76 312	10 986	311 611	51%	122 860	1 423
2001	465 694	20 927	19 561	74 535	12 412	317 900	54%	120 583	1 396
2002	420 782	16 859	21 588	70 435	14 248	283 664	55%	121 885	1 411
2003	413 343	17 970	20 142	71 667	15 088	275 891	59%	118 145	1 369

Ismertté vált közvádas bűnelkövetők statisztikája, 2001 - 2004 (KSH)

Időszak	Összesen	Ebből					
		személy elleni	közle- kedési	közrend elleni	gazda- sági	vagyon elleni	
2001.	J-M	27 575	1 973	3 904	6 170	1 243	12 529
	J-Jú	60 737	4 250	7 948	13 920	3 025	27 629
	J- Sz	87 292	6 097	11 553	19 797	4 388	39 771
	J-D	120 583	8 486	15 856	27 768	6 443	54 211
2002.	J-M	28 697	2 098	4 294	6 396	1 682	12 343
	J-Jú	62 277	4 399	9 017	14 260	3 875	26 726
	J- Sz	89 943	6 343	13 128	20 894	5 451	38 303
	J-D	121 885	8 787	18 050	28 749	7 392	50 972
2003.	J-M	27 859	2 025	4 179	6 625	1 845	11 240
	J-Jú	61 778	4 440	8 423	14 026	4 095	25 927
	J- Sz	84 961	6 065	12 097	19 728	5 924	35 166
	J-D	118 145	8 555	17 280	27 843	8 002	48 017
2004.	J-M	30 417	2 220	4 908	7 878	1 851	11 360
	J-Jú	66 919	4 864	9 798	17 827	4 112	25 472
	J- Sz	96 504	7 038	14 213	25 617	5 969	36 660
	J-D	130 182	9 453	19 034	34 608	8 181	49 528


A regisztrált bűncselekmények és bűnelkövetők számának alakulása Magyarországon (1982-2003)



■ Regisztrált bűncselekmények

■ Regisztrált bűnelkövetők

■ Bűncselekmények száma összesen ■ Vagyon elleni bűncselekmények




tendenciák

- '70-es évek előtt: alacsony szinten stagnált
- '80-as évek: gyorsuló növekedés
- **Bűnözés szerkezete** átalakul:
vagyon elleni, erőszakos bűntettek száma nő
- **Motívum változása:**
szükséglet-bűnözés → jóléti bűnözés megjelenése
- **Jövőbeli várható tendenciák:**
új bűnelkövetési formák; gazdasági, kábítószerrel kapcsolatos, szervezett, informatikai bűncselekmények, fiatalok által elkövetett bűncselekmények aránya nő



Alkoholizmus

Alkoholizmus



Szociológiai definíció:

olyan mértéktelen és rendszeres szeszital fogyasztás, amelynek hatására az egyén a társadalmi normákat megsértő módon viselkedik, önmaga, környezete számára kárt okoz, a társ.i státuszához kapcsolódó szerepelvárásoknak nem tud megfelelni, ezzel egyidejűleg egészségi állapota romlik

Statisztikai nehézségek



- Nincs egységes definíció
- Mi a mértékletesség?
- Nehézkes a fogyasztás mérése (HP...)
- Ellátórendszer – töredéke kerül be
- Látencia – hosszú távú folyamat

Kockázati sávok:

	Férfiak/hét	Nok/hét
Alacsony kockázat Felelősségteljes, megfontolt	21 (2-3/nap)	14 (1-2/nap)
Megnövekedett kockázat Veszélyes fogyasztás	35 (4-7/nap)	21 (3-5/nap)
Ártalmatlan ivás	35 felett (e felett)	21 felett (e felett)

1 ital=

1 pohár bor
1 pohár sör
3 cl tömény

Mérési módok

□ Jellinek-képlet:

A májzsugorodásban meghaltak száma $X \cdot 0,6$ (60 % az alkohol miatt betegedik meg) $X \cdot 144$ (meghaltak száma)

□ Ledermann módszer

Egy évben elfogyasztott összes alkohol megoszlása alapján: keveset-átlagosat-sokat ivó

egy főre jutó szeszesital-fogyasztás alapján

□ Intézményi adatok, nyilvántartások

Körzeti orvos, kórház, rehabint., szociális int.

Alkoholistává címkézés

Alkoholista = akit a környezete és a társadalom erre hivatott intézményei annak ítélnék

Folyamata:

1. Mikrokörnyezet

Alap: szerepkonfliktusok, anyagi gondok, közvetlen emberi viszonyok romlása

2. Orvosi ténymegállapítás

Egészségi problémák – fizikai szövődmények

3. Más társadalmi intézmények

Egészségügyi, szociális, rendészeti intézmények

4. önminősítés


Alkoholfüggők számának becslése I.

Gondozóintézetek adatai


tízezres nagyságrend: kb. 40 ezer fő

a gondozottak kb. 80-85%-a férfi


	1990	2000	2001	2002
Nyilvántartott alkoholisták száma	64.416	42.272	39.364	34.300
Alkoholisták becsült száma, ezer	588	829	755	



Tízezer lakosra jutó nyilvántartott alkoholisták száma (1990-2005)



Az alkoholisták becsült száma (1990-2005) (ezer fő)



Forrás: KSH, Stadat-rendszer

Alkoholfüggők számának becslése II.

Magyarországon az egy főre jutó (abszolút) alkoholfogyasztás literben (Ledermann):



ÉV	BOR	SÖR	ÉGETETT SZESZ	ÖSSZESEN
<i>1934</i>	32,1	3,1	3,3	5,4
<i>1960</i>	29,9	36,8	2,8	6,1
<i>1970</i>	37,7	59,4	5,4	9,1
<i>1980</i>	34,8	86,0	9,3	11,7
<i>1990</i>	27,7	105,3	8,5	11,1
<i>1995</i>	26,6	75,3	6,8	10,0
<i>1997</i>	29,0	70,0	6,5	10,1



Alkoholfüggők számának becslése III.

Alkoholos májzsugor okozta halálozás (Jellinek-tétel) alapján:


ÉV	FÉRFI	NŐ	ÖSSZES
<i>1980</i>	1194	362	1156
<i>1985</i>	2288	736	3024
<i>1990</i>	2951	1129	4080
<i>1992</i>	4297	1508	5805
<i>1995</i>	5402	1902	7304
<i>1999</i>	4524	1492	6016




Felnőtt alkohol-fogyasztás, 15 év felettek/fő

Az Európai Bizottság egyik kiadványa az összesített alkoholfogyasztást 2002-ben a 15 év fölötti lakosokra számítva **17 liter/fő** körülire becsli, ezen belül az illegálisan előállított és fogyasztott mennyiséget az össz-fogyasztás 20-22%-ára

teszi. (Alcohol-related Harm in Europe – Key data October 2006 (European Commission, Health & Consumer Protection, Directorate General))



Azon 16 évesek aránya, akik a megkérdezés előtti 30 napban 3 vagy többször lerészegedtek, egyes európai országokban(2003) (%)



Alkoholfüggők számának becslése IV.

Alkoholisták becsült száma a májzsugorban meghaltak száma és a gondozói adatok alapján:

ÉV	FÉRFI	NŐ	ÖSSZES
<i>1980</i>	171 936	52 128	224 064
<i>1985</i>	329 472	105 984	435 456
<i>1990</i>	424 944	162 576	587 520
<i>1995</i>	777 888	273 888	1 051 776
<i>1998</i>	643 536	216 432	859 968
<i>1999</i>	651 456	214 848	866 304



tendenciák

- Világviszonylatban az elsők között voltunk (5.), a volt szocialista országokban 1.
- Demográfiai, társi összetétel:
 - Férfiak, de nők növekvő aránya
 - 40-60 év között
 - Minden társi rétegben, de alsóbb: gyakoribb
- Alkohollal összefüggő problémák
 - Öngyilkosság, bűnözés, egészségi pr., családi konfl....

Nemzeti Népegészségügyi Program (2003)

CÉLKITŰZÉSEK:

az alkoholbetegek száma a jelenlegi 800-900 ezer főről 2012-ig 500 ezer alá csökkenjen

A Program keretében az alábbi területeken történnek intézkedések 2004 folyamán:

- Alkohol betegek korai kezelésbevételének támogatása a munkahelyeken
- Alkohol betegek korai kezelésbevételének fejlesztése az alapellátásban
- Gyógyult alkoholbetegek civil szervezeteinek és az alkohol, illetve drog területen működő önszervező csoportok fejlesztése
- Szenvedélybetegek szociális ellátásnak fejlesztése
- Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának – drogambulanciák, drogrehabilitációs intézményrendszer – fejlesztése

Alkohol-politika és –stratégia 2009 (tervezet)

Letölthető az Egészségügyi Minisztérium honlapjáról:

<http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/koncepcio-k-vitaanyagok/alkohol-politika>

BOOZER'S WEEK




© Original Artist
Reproduction-rights obtainable from
www.CartoonStock.com




Öngyilkosságnak nevezünk minden olyan halálesetet, amelyet közvetlenül vagy közvetve magának az áldozatnak valamilyen pozitív vagy negatív aktusa idézett elő, ha tudta, hogy aktusa szükségképpen erre az eredményre vezet.

Öngyilkosság

Öngyilkosok számának változása Magyarországon



Az öngyilkosságok száma (1980, 1990-2005)



Az öngyilkosok
háromnegyede férfi,
a kísérleteket
leginkább nők hajtják
végre

Forrás: KSH, Stadat-rendszer

MAGYARORSZÁGI HELYZET

Öngyilkossági statisztika

□ Demográfiai különbségek:

A nemek szerinti megoszlás hosszú évek óta állandóságot mutat, az öngyilkosok több, mint kétharmada férfi.

□ Az életkor növekedésével egyre gyakoribb, de főleg 60 év alatt.


□ Magasabb az öngyilkosok aránya az egyedül élők körében.

2. Területi különbség: A



falvakban az utóbbi években megnőtt az öngyilkosok aránya, ami a falusi népesség elöregedésével magyarázható

3. Társadalmi rétegek szerint:

Minél alacsonyabb státuszú, rosszabb társadalmi helyzetű csoportot vizsgálunk, annál nagyobb öngyilkossági gyakorisági mutatókat kapunk.



A 100 000 lakosra jutó öngyilkosságok és önsértések száma egyes európai országokban (2004)




Forrás: European mortality database (MDB), World Health Organization Regional Office for Europe és KSH






Öngyilkosság

Az elkövetés módjai 2000-ben




Öngyilkosság

A két leggyakoribb technikával elkövetett öngyilkosságok aránya az adott év öngyilkosságainak összességéhez viszonyítva (%)




A 100 000 lakosra jutó öngyilkosságok és önsértések száma a magyarországi régiókban (2003)




Az öngyilkosságot elkövetők aránya foglalkoztatási státusz és végzettség szerint (%)

2003	Foglalkoztatottak	Munkanélküliek	Nyugdíjasok	8 általános	Középfokú végzettség	Felsőfokú végzettség
Közép-Magyarország	27,6	4,3	51,2	61,5	11,2	5,1
Közép-Dunántúl	39,2	8,4	61,5	69,9	16,7	3,0
Nyugat-Dunántúl	38,2	12,0	69,9	52,4	27,7	6,3
Dél-Dunántúl	21,9	9,6	52,4	60,8	22,3	5,0
Észak-Magyarország	29,0	12,0	50,7	49,3	29,0	6,1
Észak-Alföld	30,2	7,8	56,1	62,4	22,2	3,2
Dél-Alföld	27,3	6,3	59,7	62,6	17,8	4,5
ORSZÁG ÖSSZESEN	29,5	7,8	53,5	60,5	19,6	⁴⁸ 4,6

Map of suicide rates
(per 100 000; most recent year available as of March 2002)



Death due to suicide, by gender - Standardised death rate by 100 000 inhabitants (2008)



KARAKTERTÍPOLÓGIA

fig 1



pesszimista
önqyilkos

fig 2



optimista
önqyilkos

fig 3



ügyetlen
önqyilkos







Pszichiátrai (elme- és ideg-) betegek

Pszichiátriai (elme- és ideg-) betegek


Nyilvántartott gondozottak száma





Nyilvántartott gondozottak koronkénti megoszlása




**Pszichiátrai
(elme- és
ideg-)
betegek**



Pszichiátriai felnőttbeteg-gondozás: gondozásba vett új betegek száma (1990-2005)




Pszichiátriai ifjúságibeteg-gondozás: gondozásba vett új betegek száma (1990-2005)



Forrás: KSH, Stadat-rendszer

Pszichiátriai felnőttbeteg-gondozás betegforgalma (1990-2005) (ezer fő)



Forrás: KSH,
Stadat-rendszer

Pszichiátriai ifjúságibeteg-gondozás betegforgalma (1990-2005) (ezer fő)

